KORIAN
Kinetika Sardegna
Case di Cura

SANT'ELENA
Casa di Cura Polispecialistica
Viale Marconi 160, 09045
Quartu Sant'Elena (CA)
urp@santelena@korian.it
T +39 070 86051

Prelievo venoso per :

ALDOSTERONE (ortostatismo e clinostatismo)

PROVETTE: 1 SIERO

Devono essere raccolti due campioni:

- Il primo prelevato al paziente rimasto in posizione clinostatica per almeno 1 ora
- Il secondo prelevato al paziente rimasto in posizione ortostatica ad attività moderata per almeno 1 ora

Durante le due settimane precedenti il prelievo si consiglia, previa consultazione del medico curante e se non indispensabili, di evitare l'assunzione di farmaci, in particolare di:

- ACE
- Antinfiammatori non steroidei
- Beta-bloccanti

Nei 5 giorni che precedono l'esecuzione dell'esame è necessario consumare alimenti senza sale e aggiungere poco sale nei cibi cotti.

Per esigenze amministrative e contabili è necessario che il medico richiedente indichi nella prescrizione 2 determinazioni di Aldosterone.

SE NON SPECIFICATO CLINOSTATISMO E ORTOSTATISMO SI PROCEDERA' AD ESEGUIRE L'ESAME SOLO IN ORTOSTATISMO